

"L'Echange", Revue Linnéenne

Numéro spécial

M. PIC, Rédacteur

Opuscula martialia


XIII


(28 septembre 1944)

MOULINS

" LES IMPRIMERIES RÉUNIES "

15, RUE D'ENGHIEN, 15





SciELO/MZUSP

Les nouveautés de ce fascicule figurent toutes dans la collection Pic, à l'exception d'un Longicorne au Muséum de Paris.

Drupeus testaceipes n. sp. [Helod.]. Oblongus, nitidus, niger, antennis ad basin, femoribus tibiisque testaceis, L. 3 mill. Japon. — Voisin de *lactabilis* Lew., mais pattes presque entièrement claires, thorax entièrement foncé.

D. marginatus n. sp. Subovatus, nitidus, pruinoso pubescens, testaceus, antennis nigris, ad basin testaceis, capite postice elytrisque piceis, his testaceo marginatis, L. 3,5 mill. Indes. — Peut se placer près de *vittipennis* Lew.

D. notatithorax v. n. **Theresæ**. En majeure partie roux, avec les antennes, la tête en arrière et le disque du thorax foncés ; Tonkin. — La forme type a les élytres foncés.

Malthodes Manevali n. sp. ♂ [Malac.]. Subparallélus, nitidus, niger, elytris pallidioribus, apice vage luteis, abdomine pro parte luteo. L. 3 mill. Haute-Loire : Mont Meygal (ex Maneval). Antennes noires de la longueur du corps robustes, atténuées à l'extrémité ; tête large, finement ponctuée ainsi que le thorax, celui-ci court et large, non fortement élargi en avant, vaguement angulé avant le milieu, mais rétréci antérieurement ; élytres nettement plus larges que le thorax, peu longs, à ponctuation peu marquée, irrégulière ; dernier segment abdominal large, subangulé en avant, dernier styliforme, fait de 2 parties soudées à la base, en forme de bâton recourbé et subtriangulairement élargi au sommet, antépénultième segment dorsal très large, pénultième étroit, allongé, horizontal, dernier très incliné en dessous, long, un peu

échancré au sommet. — Espèce caarctérisée par sa structure abdominale, pouvant se placer près de *procerulus* Ksw.

Hedybius bicoloripes n. sp. ♀ [Malac.]. Parum elongatus, nitidus, niger, capite antice, antennis ad basin, thoracé circa, pedibus anticis pro maiore parte et femoribus intermediis testaceis. L. 4,5 mill. Afr. Australe. — Peut se placer près de *curvidens* Chp., caractérisé par ses pattes en majeure partie noires.

H. nigrovittatus mihi, d'Abyssinie, ressemble à *viridipennis* Pic ♂, mais la tête est ornée de plusieurs poils noirs insérés sur une carène transversale irrégulière; le thorax est roux avec une bande médiane noire métallique. Chez la *v. n. notaticollis*, le thorax est roux, largement foncé sur le milieu et aussi marqué de foncé sur les côtés.

H. bimaculaticollis mihi, d'Abyssinie, a sa coloration générale analogue à celle de *formosus* Reiche, mais le thorax possède une macule noire placée de chaque côté, sur la plus large partie de cet organe et la coloration foncée de la tête est sinuée antérieurement.

H. viridipennis v. n. reductenotatus ♂. Thorace rufo, in disco nigro notato. Abyssinie.

H. limbatipennis Pic. La coloration du thorax varie chez les ♀, cet organe ayant soit le disque orné d'une macule noire (*v. uninotatus*), soit avec quatre macules foncées transversalement disposées (*v. 4-notatus*). Erythrée.

Mixis unicoloriceps n. sp. ♀ [Malac.]. Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, pectore nigro, elytris in singulo ad basin et post medium in disco nigro-violaceo maculatis, lateraliter marginatis. L. 3 mill. Transvaal. — Voisin de

Bonnefoii Pic, mais tête concolore et macule postérieure des élytres non profondément échancrée.

M. alboapicalis n. sp. ♂. Oblongo-elongatus, nitidus, elytris opacis, niger, antennis (articulō 1° supra nigro), thoracē (illo antice nigro notato) abdomine pedibusque pro parte testaceis, elytris nigris, apice albis et testaceo appendiculatis, in singulo ad suturam antice, ad medium externe albo maculatis. L. 3 mill. Kenya. — Élégante petite espèce, à dessins des élytres particuliers.

Xystropus granulosus n. sp. [Hétér.]. Oblongo-elongatus, postice valde attenuatus, nitidus, niger, supra æneus; antennis apice dilatatis; thorace breve, medio dilatato-arcuato, postice attenuato, dense punctato et sparse fortiore punctato; elytris sparse et longe albo aut fusco pilosis, minute lineato-punctatis et granuloso-punctatis. L. 6 mill. Brésil: Minas. — Voisin de *pilosus* M., plus foncé, élytres sans traces de mouchetures pileuses.

X. Borchmanni n. sp. Plus minusve elongatus, postice attenuatus, nigro-æneus aut olivaceus, nitidus, sat longe griseo, pro parte irregularitèr pubescens et sparse albo aut fusco hirsutus; thorace semicirculare, dense punctato et sparse fortiore punctato; elytris diverse, pro parte lineato-punctatis, punctis piligeribus, sat minutis ornatis. L. 7 mill. Caracas. — Caractérisé par la forme du thorax et la pubescence.

X. Baeri n. sp. Oblongus, postice valde attenuatus, nitidus, niger, supra æneus; elytris griseo tessellatis et albo aut fusco hirsutis, granuloso punctatis. L. 5 mill. Pérou. — Voisin de *fasciculatus* Frm.

X. superbus n. sp. Latus et nitidus, sparse hispidus, minute punctatus, cyaneus, capite inter oculos purpureo, thorace elytris cupreis; antennis brevibus, apice latis; humeris prominulis; pedibus sat brevibus. L. 12 mill.

Colombie. — Grande et brillante espèce ne ressemblant à aucune autre.

X. rufoænescens n. sp. Minutus, oblongo-elongatus, rufo-ænescens, capite postice thoraceque obscurioribus, antennis tarsisque nigris; thorace breve et lato, fortiter non dense punctato; elytris thorace paulo latoribus, sparse pro parte regulariter albo pubescentibus, fortiter punctatis, L. 3,5 mill. Brésil. — Plus allongé et plus clair que *minor* Pic.

X. lineatus n. sp., de la R. Argentine, ressemble à *griseolineatus* Frm., en diffère par les élytres non fortement bombés sur leur milieu, les lignes de pubescence blanche moins nettes et moins régulières avec des soies dressées bien distinctes.


Le *longipilis* mihi, de la même origine, est plus robuste, avec la pubescence peu fournie et longue, la coloration des élytres un peu roussâtre.

X. Theresæ n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatis, parum convexus, nitidus, inhirsutus, nigro-ænescens, membris nigris, longe albo lineatis, L. 9 mill. Brésil. — Voisin de *grandis* Pic, moins bombé, avec les bandes élytrales plus nettes, faites de deux rangées de poils blancs. Dédié à la chère mémoire de ma femme.

Le *Perroudi* mihi, du Brésil, ressemble au précédent, mais plus petit, avec le thorax plus transversal, les élytres moins longs, à lignes de pubescence alternées, simples ou doubles.

Le *hirsutus* mihi, du Brésil, à lignes pubescentes moins régulières, est subparallèle, régulièrement convexe, fortement ponctué et très hirsute.

X. corumbanus n. sp. Minutus, elongatus, nitidus, sparse et longe griseo pubescens, diverse hirsutus, niger,



supra ænescens ; antennis sat gracilibus ; thorace breve, sat lato, lateraliter fere recto, parum fortiter non dense punctato ; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, parum fortiter, pro parte lineato punctatis. Long. 3,5 mill. Brésil. — La *var. minasensis* mihi est un peu plus grande, le thorax est plus large, les élytres sont plus convexes, à pubescence moins fine et moins espacée. Espèce voisine de *amazonicus* Pic.

X. Fruhstorferi mihi, du Brésil, est petit, subparallèle, convexe, d'un bronze doré très brillant en dessus avec le devant de la tête roux ; le thorax est large, fortement ponctué, les élytres sont faiblement striés et à forte ponctuation, avec des rangées nettes faites de poils clairs simples.

Lystronychus (s. g. nov. **Spinolystroonychus** caractérisé par le thorax muni de dentelures sur les côtés) **bisbinotatus** n. sp. [Hétér.]. Minutus, parum elongatus, subopacus, nigro-ænescens, elytris in singulo ante et post medium in disco reducte rufo-luteo fasciatis. L. 3 mill. Cayenne.

L. bicoloratus n. sp. Oblongus, parum latus, subopacus, pro parte niger, pro parte rufo-æneus, elytris post basin oblique et externe rufo-luteo oblique fasciatis, ad medium vage rufo-tinctis, femoribus ad basin rufis. Long. 6 mill. Cumana. — Voisin du précédent, plus large et à dessins différents.

L. axillaris Dej. Elongatus, opacus, nigro-olivaceus, aliquot paulo rufescens, elytris ad humeros luteo notatis, longe pilosus ; antennis filiformibus ; capite thoraceque dense punctatis ; elytris thorace valde latioribus, minute lineato-punctatis. L. 8 mill. Guyane. — A placer près de *argentinus* Pic, en diffère nettement par la macule humérale jaunâtre.

Lystronychus s. str. semiviridis n. sp. Oblongus, parum nitidus, glaber, niger, membris pro parte viridibus, capite thoraceque viridibus, elytris cyaneis, minute striato punctatis, intervallis subconvexis. L. 10 mill. Paraguay. — Voisin de *major* Pic, coloration différente et intervalles des élytres subconvexes.

L. viridescens n. sp., du Brésil, voisin du précédent, mais avec une coloration générale verd tre sur le dessus du corps, n'a pas les intervalles des élytres subconvexes et les angles postérieurs du thorax sont nettement marqués, au lieu d'être émoussés. Brésil.

L. diversipes n. sp., de la R. Argentine, est noir, en partie teinté de verd tre avec le thorax et les élytres verts, les membres sont noirs et les cuisses en majeure partie rouges, le thorax est large avec les angles postérieurs très marqués, finement et éparsément ponctué, les élytres sont faiblement substriés, finement ponctués, avec les intervalles à ponctuation irrégulière. — A placer près de *rufofemoralis* Bor.

L. foveolatus n. sp. Oblongus, nitidus, hirsutus, nigro-olivaceus, membris nigris, femoribus ad basin rufis; capite brevè, diverse sat dense punctato; antennis parum gracilibus; thorace transversò, lateraliter arcuato, diverse non dense punctato, postice externe foveolato-impresso; elytris sat brevibus, minute lineato-punctatis et albo pilosis. L. 8 mill. Brésil. — Voisin de *ignatiosus* Pic, très distinct par son thorax particulier et les cuisses en partie rousses.

Dasytoxystropus sublineatus n. sp. [Héter.]. Elongatus, subparallelus, convexus, nitidus, nigro-ænescens, antennis nigris; thorace brevè, sat lato, lateraliter subarcuato, dense punctato; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, postice attenuatis, griseo pubescens, pro parte

lineolatis et breve hirsutis, mediocre et irregulariter punctatis. L. 6 mill. Brésil. — Voisin de *subparallelus* Pic.

D. densepunctatus mihi, du Brésil, de forme allongée et convexe, est noir, un peu bleuté, fortement et densément ponctué, surtout sur les élytres, dépourvu de pubescence blanche mais ayant des soies obscures dressées. L. 6 mill.

Xystronia striata n. sp. [Héter.]. Elongatus, postice attenuatus, nitidus, fere glaber, rufus, pro parte viride notatus, capite thoraceque nigro-metallicis, illis diverse non dense punctatis, elytris striato-punctatis, intervallis subconvexis. L. 9 mill. Brésil. — Espèce très caractérisée par ses élytres ornés de stries ponctuées de gros points.

X. atricolor n. sp. Elongatus, nitidus, breve hirsutus, niger, abdomine paulo cyaneo; capite parum elongato, diverse punctato; thorace transverso, subglobuloso, minute non dense punctato; elytris thorace latoribus, elongatis, apice attenuatis, minute lineato punctatis; pedibus elongatis, femoribus subclavatis. L. 10 mill. Brésil. — Espèce caractérisée par sa coloration noire jointe à la forme du thorax.

Sous le nom de *azurea* Déj., je possède deux exemplaires, de l'Am. Méridionale, de coloration bleue teinte un peu de verdâtre et se distinguant de suite de *cærulea* Sol. par le dessus du corps non brillant.

X. vagepurpurea n. sp. Elongatus, fere glaber, supra subopacus, cyaneus, femoribus ad basin rufis; elytris purpureo tinctis, minute lineato punctatis, intervallis unipunctatis. L. 11 mill. Brésil. — Ressemble à *semipurpurea* Pic, coloration générale analogue, mais cuisses bicolores.

Prostenus asperatus n. sp. [Héter.]. Angustatus,

postice attenuatus, nitidissimus, viride-metallicus, infra corpore pedibusque pro parte rufo tinctis, antennis nigro-violaceis, ad basin gracilibus; thorace parum lato, diverse et sparse punctato; elytris diverse lineato punctatis, apice paulo asperatis; pedibus elongatis, fere inclavatis. L. 10 mill. Surinam. — A placer près de *laticornis* Saund.

P. impressiceps n. sp. Elongatus, hirsutus, supra opacus, cyaneus, elytris abdomineque pro parte rufo tinctis; capite postice valde angustato, supra fortiter excavato et impresso; antennis elongatis, gracilibus, articulis 3° et sequentibus externe apice latioribus; elytris convexis, parum latis, lineato punctatis; pedibus elongatis, femoribus mediocriter clavatis. L. 13 mill. Brésil. — On peut établir pour cette espèce (et sans doute aussi *nodicornis* Frm.) un s. g. nouveau (**Excavatoprostenus**), caractérisé par la forme de la tête très rétrécie en arrière et excavée en dessus, les antennes pourvues d'articles élargis au sommet.

P. Donckieri n. sp. Oblongus, parum nitidus, elytris opacis, olivaceo-viridescens, membris cyaneis aut violaceis; antennis elongatis, apice valde dilatatis; thorace sat lato, lateraliter arcuato, minute et sparse punctato; elytris thorace valde latioribus, parum elongatis, postice attenuatis, minute lineato-punctatis; femoribus non clavatis. L. 12 mill. Brésil. — Peut se placer près de *brevicornis* Frm.

P. nitidipennis n. sp. Elongatus, hirsutus, cyaneus, nitidus, capite thoraceque subopacis, dense punctatis; thorace non transverso; elytris sat latis, parum elongatis; femoribus valde clavatis, tibiis posticis curvatis. Long. 12 mill. R.-Argentine. — Voisin de *angusticornis* Frm.; caractérisé par les élytres brillants.

P. nitidus n. sp. Elongatus, elytris sat latis, parum

hispidus, nitidus, cyaneus; antennis apice late dilatatis; thorace lato, postice paulo strangulato, minute non dense punctato; elytris lateraliter sinuatis, apice valde attenuatis; pedibus elongatis, femoribus paulo clavatis, tibiis posticis sinuatis. L. 12 mill. Paraguay. — Sans doute voisin de *cyaneus* Frm., plus brillant, thorax à ponctuation écartée, etc...

P. opacipennis n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, elytris opacis, hispidus, nigro-cyaneus, capite thoraceque nigro-metallicis, elytris nigro sericeis, antennis apice valde dilatatis; thorace parum lato, ad medium dilatato, arcuato, minute parum dense punctato; elytris latis, sat brevibus; pedibus sat gracilibus, tibiis posticis sinuatis ♂, aut subrectis ♀. L. 10 mill. Brésil. — Caractérisé par sa coloration, ses pattes graciles.

Microprostenus Hickeri n. sp. [Héter.]. Noir, un peu olivâtre, thorax teinté de roux antérieurement, élytres ayant chacun, en plus d'une macule humérale rousse, une macule discale prémédiane un peu oblique avec une bande postérieure externe de même coloration. L. 6 mill. Brésil. — Caractérisé par ses dessins élytraux rouges plus nombreux que chez *longicornis* Pic.

Bratyna dilatipes n. sp. ♂. [Héter.]. Elongatus, opacus, testaceus, oculis, antennis, articulo ultimo excepto, abdomine, femoribus apice tibiisque diverse nigris, his posticis externe valde arcuate dilatatis. L. 7 mill. Joko. — Diffère de *apicalis* W. par les pattes en partie claires et la dilatation plus forte des tibias postérieurs.

Pseudomorauculus Le Testui n. sp. [Héter.]. Ressemble à *rufonotata* mihi, en diffère par l'avant-corps foncé, les antennes largement noires à la base, les élytres à macule humérale rousse plus large et plus longue.

Formicilla cubana n. sp. [Héter.]. Elongatus, niti-

dus, testaceus, elytris piceis, ante et post medium late testaceo fasciatis; capite parum elongato, thorace latiore; thorace elongato, sat angustato, postice stragulato; elytris latis, sat brevibus, antice paulo attenuatis. L. 2,5 mill. Cuba. — A placer près de *decorata* Kr.

Anthicus (Aulacoderus) okandjandensis n. sp. [Héter.]. Oblongo-elongatus, nitidus, nigro-piceus, capite thoraceque rufescentibus, elytris ad basin pallidioribus, ante medium transverse et paulo oblique griseo fasciatis, ante apicem luteo maculatis, antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis. L. 2,5 mill. Afr. Australe. — A placer près de *Techovi* Pic.

Zonitis philippinensis n. sp. [Héter.]. Elongatus, nitidus, breve griseo pubescens, testaceus; capite parum elongato, sat fortiter punctato, oculis valde separatis; thorace sat breve, antice attenuato, sat fortiter non dense punctato; elytris thorace valde latioribus, elongatis, minute et dense punctatis. L. 12 mill. Cébu. — Voisin de *javanus* Pic, coloration moins pâle, yeux plus écartés, etc.

Gonocnemis modestus n. sp. [Héter.]. Oblongo-elongatus, parum nitidus, minute pubescens, rufescens, antennis nigris, ad basin rufis; thorace parum lato, antice attenuato, postice non parallelo, dense punctato; elytris thorace sat latioribus, elongatis, apice attenuatis, sat fortiter lineato-punctatis, intervallis paulo costulatis. L. 4 mill. Congo. — Voisin de *quadricollis* Fm., en diffère par les antennes moins épaisses, le thorax moins parallèle sur les côtés.

G. suturalis n. sp. Parum elongatus, subnitidus, fere glaber, niger, elytris paulo rufescentibus, tarsi rufis; thorace parum elongato, antice attenuato, postice medio sulcato et lateraliter impresso, dense punctato; elytris tho-

race sat latioribus, elongatis, apice attenuatis, fortiter lineato-punctatis, intervallis costulatis, sutura depressa, subopaca L. 4,5 mill. Congo. — Voisin de *rufitarsis* Pic par la sculpture des élytres, plus étroit et dépourvu de poils dressés.

Donacia madecassa n. sp. [Phyt.]. Elongatus, nitidus, rufus, elytris cyaneo tinctis, capite thoraceque late cyaneis, infra corpore pro parte antennisque nigro metallicis, pedibus rufis, femoribus apice et tibiis postice cyaneo aut brunneo tinctis ; articulo 3° antennarum 2° paulo longiore ; capite postice transverse sulcato, inter oculos profunde impresso, diverse punctato ; thorace non transverso, lateraliter sinuato, angulis anticis distinctis, supra multi impresso, medio sulcato, sat fortiter et pro parte sparse punctato ; elytris thorace valde latioribus, elongatis, postice attenuatis et apice truncatis, minute lineato-punctatis, punctis apice fortioribus. L. 7,5 mill. Madagascar. — Très distinct de *abortiva* Fm. par la coloration et la sculpture.

D. notaticollis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, nigro-metallicus, thorace luteo, lateraliter viride tincto, scutello elytrisque luteis, paulo iridescentibus, pedibus rufis, pro parte iridescentibus. L. 6 mill. Madagâscar. — De forme moins allongée que le précédent, avec le thorax moins long, à angles antérieurs non marqués.

Poecilomorpha robusta n. sp. [Phyt.]. Oblongus et latus, parum nitidus, supra rufus, elytris aurantiacis, thorace medio reducte piceo lineato, infra corpore membrisque nigris, pectore rufo maculato et abdomine testaceo. L. 11 mill. Sierra-Leone. — Voisin de *atripes* Lac., moins brillant, de coloration plus pâle, thorax marqué de foncé.

Colobapsis interrupta n. sp. [Phyt.]. Robustus, parum elongatus, subnitidus, niger, capite aurantiaco, me-

dio nigro binotato, elytris aurantiacis, apice, externe brevior, sat late nigris; membris nigris, femoribus anticis infra testaceis, L. 10 mill. Tangani a. — Voisin de *apicata* Frm., mais thorax bimaculé de noir et plus robuste, partie apicale noire des élytres sans prolongement discal.

Lema unicoloriceps n. sp. [Phyt.]. Minutus, oblongus, rufo-testaceus, antennis, articulo primo rufo excepto, tibiis tarsisque nigris, elytris ad suturam anticæ et post medium nigro notatis, signaturis nigris ad suturam anguste junctis. L. 4 mill. Mexique. — Par ses dessins élytraux, voisin de *Dejeani* Guer., s'en distingue par la forme plus raccourcie, la tête entièrement claire, etc.

L. ricana n. sp. Oblongo-elongatus, rufus, antennis, femoribus apice, tibiis, tarsis, infra corpore pro parte nigris, elytris in singulo ad humeros et ante medium in disco nigro maculatis, post medium in disco reducte transverse nigro fasciatis. L. 5 mill. Costa-Rica. — Plus allongé que le précédent avec les dessins noirs différents.

Lema breveapicalis Pic (1939), préoccupé par *breveapicalis* Pic (1924), devra prendre le nom de **angolensis**. *L. biimpressipennis* Pic (1932), préoccupé par *biimpressipennis* Pic (1931), devra prendre le nom de **impressipennis** et *v. diversipes* Pic (1931), préoccupé par *diversipes* Pic (1921), celui de **v. gabonica**.

Plectonycha atrolineata n. sp. [Phyt.]. Oblongus, niger, capite, pro parte rufescente, thorace et elytris luteis, illo nigro quadri signato, his in singulo nigro quinque vittatis, vittis pro parte ad medium interruptis, postice pro parte junctis, membris testaceis, L. 5 mill. R.-Argentine. — Très caractérisé par ses bandes longitudinales noires.

P. nigrosignata n. sp. Oblongus, niger, articulo 1^o antennarum, abdomine, thorace (illo nigro binotato), ely-

trisque rufis, his in singulo nigro quinque maculatis : macula basalis et suturalis quadrata, macula humeralis minuta, macula antemediana ad maculam basalis paulo juncta, macula transversa discoidalis postmediana, macula apicalis. L. 5 mill. Brésil. — Voisin de *variegata* Lac., dessins des élytres différents et abdomen roux, non marqué de noir.

Microcycos Coomani n. sp. [Cerambyc.]. Parum elongatus, postice attenuatus, niger, capite thoraceque griseo lineatis, elytris pro parte nigris, pro parte griseo diverse notatis, antennis nigris, articulis 3 et sequentibus ad basin late griseis ; scapo externe cicatricoso, articulo 3° ad apicem valde dilatato ; thorace brevis, lateraliter sinuato, indistincte dentato : L. 7 mill. Tonkin. — Voisin de *annulicornis* Pic, mais 3° article des antennes plus épais, thorax plus court et sans dents, élytres moins longs, à dessins gris moins condensés.

M. Theresæ mihi, de l'Annam, voisin du précédent par sa structure antennaire, à le thorax moins court, nettement tuberculé et peu ponctué, les élytres à épaules plus élevées et dessins gris plus confluent, peu parsemés de petites taches noires.

Exocentrus ruficolor n. sp. [Cerambyc.]. Oblongus, subopacus, elytris nitidis, longe hirsutus, rufescens ; thorace minute et dense punctato, lateraliter postice brevis spinoso ; elytris antice pro parte lineato-punctatis, apice sparse punctatis. L. 5 mill. Tonkin. — Voisin de *bicolor* Pic, mais coloration générale à peu près uniforme.

Falsomesosella robusta mihi, de l'Annam, très voisin de *albofasciata* Pic, mais antennes plus robustes, élytres mouchetées de fauve ou de gris sans fascie blanche nette. Par contre, le *truncatipennis* mihi, de Chine, est de forme plus étroite avec l'avant-corps plus long, les élytres sont



nettement étranglés près de la base et tronqués au sommet, ornés d'une bande prémédiane blanche irrégulière avec des mouchetures grises, ou jaunes, sur le reste.

F. minor v. annamita mihi, de l'Annam, a les élytres roux à mouchetures dispersées principalement jaunâtres.

F. Breuningi mihi, voisin de *nigronotata* Pic, ayant les élytres ornés de 2 larges fascies noires (avant et après le milieu), sinuées et sur le reste avec un revêtement mélangé jaune ou gris, parsemé de petites macules foncées. L. 7 mill. Chine.

Sophronica albopilosa n. sp. [Cerambyc.] Elongatus, nitidus, griseo pubescens et albo hirsutus, testaceus; thorace parum lato, antice attenuato, medio-luteo lineato, sat fortiter et dense punctato; elytris thorace sat latioribus, elongatis, parallelis, parum fortiter irregulariter et sparse punctatis. L. 8 mill. Abyssinie (Muséum de Paris). — Voisin de *grisea* Aur., s'en distingue par les poils uniformément clairs des élytres, les pattes et la coloration générale testacée.

S. Favareli n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, griseo pubescens, albo et fusco hirsutus, rufescens, antennis nigris, thorace breve, sat lato, parum fortiter et dense punctato; elytris thorace latioribus, sat brevibus, apice attenuatis, parum fortiter et irregulariter punctatis. Long. 6 mill. Fort Crampel. — Plus court et plus robuste que le précédent, avec les antennes foncées.

S. bicoloricornis n. sp. Parum elongatus, nitidus, griseo pubescens et hirsutus, rufo-testaceus, articulis 3 et sequentibus antennarum nigris; thorace parum lato, paulo fortiter et dense punctato; elytris parum elongatis, postice attenuatis, parum fortiter et irregulariter punctatis. L. 4 mill. Cameroun. — Plus étroit que le précédent avec les antennes bicolores.

S. Breuningi mihi, de la Côte-d'Ivoire, voisin du précédent, est roux, les antennes sont noires avec les 2 premiers articles et la base du 3^e roux, la pubescence et les poils dressés sont gris.

S. Crampeli n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, pro parte fusco hirsutus, niger, supra rufescens, antennis nigris; thorace parum lato, lateraliter fere recto, minute et dense punctato; elytris parum elongatis, parallelis, minute sat dense punctatis. L. 5 mill. Fort Crampel. — Caractérisé par la forme du thorax et la ponctuation moins forte que d'ordinaire.

S. lineatopunctata n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, griseo pubescens, rufus, elytris in medio ad suturam paulo brunneis, antennis nigris, ad basin rufis; thorace sat lato, fortiter sat dense punctato; elytris latis, sat brevibus, lineato-punctatis. L. 6 mill. Dahomey. — Espèce caractérisée par la ponctuation élytrale en rangées.

S. sparsepilosa n. sp. Parum elongatus, nitidus, sparse albo pilosus et fusco hirsutus, niger, elytris et pedibus pro parte rufis; thorace breve et lato, fortiter et dense punctato; elytris elongatis, postice attenuatis, fortiter et irregulariter punctatis. L. 10 mill. Dahomey. — Voisin de *amplipennis* Pasc., moins élargi, à ponctuation moins rapprochée et plus forte, élytres avec de larges soies blanches éparses.

S. semistriata n. sp. Elongatus, postice paulo attenuatus, nitidus, niger, elytris vage metallicis; capite, thorace medio scutelloque sat dense luteo pubescentibus, in elytris griseo pubescens, albo et fusco hirsutus; thorace parum breve, lateraliter subrotundato; elytris elongatis, postice attenuatis, lineato-punctatis et intus substriatis. L. 12 mill. Benito. — Très caractérisé par le revêtement de l'avant-corps et les élytres, sur leur partie présuturale,

un peu striés (4 stries sur chacun), s'effaçant aux extrémités).


S. cherenensis n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, diverse hirsutus, rufescens, thorace pro parte et elytris post scutellum obscuris; antennis elongatis, sat gracilibus; thorace parum lato, apice attenuato, parum fortiter et dense punctato; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, parallelis, sat minute punctatis. L. 7 mill. Erythrée. — Caractérisé par ses longues antennes et la forme plus étroite que d'ordinaire.


S. maculosa n. sp. Elongatus, nitidus, niger, supra paulo metallicus, capite, thorace scutelloque dense luteo pubescentibus, thorace in disco glabro maculato, elytris luteo maculatis, maculis pro parte et diverse junctis; antennis corpore longioribus, scapo paulo cicatricoso; thorace postice dilatato subrotundato, elytris subparallelis, sat minute et pro parte irregulariter punctatis, luteo hirsutis. L. 9 mill. Abyssinie. — Très caractérisé par son revêtement particulier.

Dimbrokoa (s. g. nov. de *Sophronica* El.). Oculis valde transversis, approximatis; scapo elongato, claviforme, antennis parum fortis, corpore brevioribus, longe villosis; thorace elongato, lateraliter fere recto; elytris elongatis et angustatis; pedibus sat brevibus, pilosis. S. g. caractérisé par la structure de la tête et des antennes, établi pour l'espèce qui suit.

D. apicalis n. sp. Angustatus, elongatus, nitidus, longe griseo pubescens, pro parte fusco hirsutus, niger, elytris rufo-castaneis, apice breve luteis, sat fortiter et dense punctatis. L. 6,3 mill. Côte-d'Ivoire.

M. Pic.





SciELO/MZUSP